



INDICADORES BÁSICOS DE SALUD 2009

INFORMACIÓN POR REGIONES

[Datos Generales de Chile](#)

[Mortalidad de Chile](#)

[Región de Arica y Parinacota](#)

[Región de Tarapacá](#)

[Región de Antofagasta](#)

[Región de Atacama](#)

[Región de Coquimbo](#)

[Región de Valparaíso](#)

[Región Metropolitana de Santiago](#)

[Región del Libertador Bernardo O'Higgins](#)

[Región Del Maule](#)

[Región Del BíoBío](#)

[Región de La Araucanía](#)

[Región de Los Ríos](#)

[Región de Los Lagos](#)

[Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo](#)

[Región de Magallanes y de la Antártica Chilena](#)

[Ir a Pág Principal](#)

[Gráficos](#)

Algunos indicadores generales de Chile, 2007-2010

Indicador	Número	Valor relativo	Fuente	Año
Población	16.928.873		1	2009
Hombres	8.379.571		1	2009
Mujeres	8.549.302		1	2009
Población que reside en zonas rurales (%)	2.209.627	13,05	1	2009
Hombres	1.174.851	14,02	1	2009
Mujeres	1.034.776	12,10	1	2009
Tasa global de fecundidad (hijos por mujer)		1,88	2	2007
Nacidos vivos y natalidad (por 1.000 habts.)	242.056	14,58	2	2007
Atención profesional del parto (%)		99,73	2	2007
Nacidos vivos con bajo peso al nacer (%)		5,75	2	2007
Nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (%)		16,46	2	2007
Años de vida potencial perdidos (AVPP) (por 1.000 personas residentes)	1.256.375	76,99	2	2007
Defunciones totales y mortalidad general (por 1.000 habts.)	93.000	5,60	2	2007
Defunciones de menores de 1 año y mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos)	2.009	8,30	2	2007
Defunciones maternas y mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos)	44	18,18	2	2007
Defunciones por síntomas, signos y hallazgos anormales no clasificados en otra parte (%)	2.718	2,92	2	2007
Tasas de mortalidad (por 100.000 habts.):				
Ambos sexos de 20 a 44 años	7.212	114,32	2	2007
Hombres	5.219	164,71	2	2007
Mujeres	1.993	63,47	2	2007
Ambos sexos de 45 a 64 años	18.617	536,96	2	2007
Hombres	11.647	688,13	2	2007
Mujeres	6.970	392,77	2	2007
De 20 a 64 años por Enfermedades Sistema Circulatorio (CIE-10: I00-I98)	5.086	52,03	2	2007
De 20 a 64 años por Tumores Malignos (CIE-10: C00-C97)	6.952	71,12	2	2007
De 20 a 64 años por Enfermedades Sistema Respiratorio (CIE-10: J00-J99)	1.118	11,44	2	2007
De 20 a 64 años por Causas Externas de Mortalidad (CIE-10: V01-Y98)	5.391	55,15	2	2007
De 20 a 64 años por Cirrosis Hepática y Otras Enfermedades Crónicas del Hígado (CIE-10: K70-K76)	2.215	22,66	2	2007
De 20 a 64 años por Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales no Clasificados en otra parte (CIE-10: R00-R99)	611	6,25	2	2007
Egresos Hospitalarios (totales y por 1.000 habitantes)	1.632.888	98,38	3	2007
Cobertura de Inmunizaciones (%):				
BCG (Recién nacido)		99,14	3	2008
Pentavalente (3ra. dosis)		94,93	3	2008
Trivírica (12 meses)		91,92	3	2008
Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención, por habitante				
Total	40.044.058	2,39	3	2008
Atención Primaria	16.328.799	0,97	3	2008
Atención de Especialidades	6.743.950	0,40	3	2008
Atención de Urgencia	16.967.222	1,01	3	2008
Camas de hospitalización, sectores público y privado y disponibilidad por 1.000 habts.	38.842	2,29	3	2008
Tasa de desocupación de la población de 15 y más años (%)		8,50	1	Dic 2009-Feb 2010
Tasa de desocupación de de hombres de 15 y más años (%)		7,70	1	Dic 2009-Feb 2010
Tasa de desocupación de la mujeres de 15 y más años (%)		9,80	1	Dic 2009-Feb 2010
Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita US\$ (Método Atlas)		9.370	4	2008
Índice de Desarrollo Humano (IDH):				
Valor absoluto		0,878	5	2009
Clasificación mundial		44	5	2009
Inflación anual (%)		-1,40	1	2009

Fuentes: 1 INE; 2 CNEV; 3 DEIS-MINSAL; 4 Banco Mundial; 5 PNUD

Chile: Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.


Código CIE-10	Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
C00-C97	Tumores malignos	21.488	129,5
	Hombres	11.084	134,9
	Mujeres	10.404	124,1
I00-I99	Enfermedades del sistema circulatorio	26.038	156,9
	Hombres	13.234	161,1
	Mujeres	12.804	152,8
J00-J99	Enfermedades del sistema respiratorio	9.430	56,8
	Hombres	4.709	57,3
	Mujeres	4.721	56,3
K00-K93	Enfermedades del sistema digestivo	6.556	39,5
	Hombres	4.002	48,7
	Mujeres	2.554	30,5
V00-Y98	Causas externas de mortalidad	7.994	48,2
	Hombres	6.284	76,5
	Mujeres	1.710	20,4
Código CIE-10	Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa*
I20-I25	Enfermedad isquémica del corazón	8.426	50,8
	Hombres	4.950	60,2
	Mujeres	3.476	41,5
I60-I69	Enfermedades cerebrovasculares	8.278	49,9
	Hombres	3.958	48,2
	Mujeres	4.320	51,5
E10-E14	Diabetes mellitus	3.625	21,8
	Hombres	1.786	21,7
	Mujeres	1.839	21,9
J12-J18	Neumonía	3.803	22,9
	Hombres	1.716	20,9
	Mujeres	2.087	24,9
K70-K76	Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado	3.987	24,0
	Hombres	2.780	33,8
	Mujeres	1.207	14,4
V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89	Accidentes de tránsito terrestre	2.124	12,8
	Hombres	1.728	21,0
	Mujeres	396	4,7
X60-X84	Lesiones autoinfligidas intencionalmente	1.926	11,6
	Hombres	1.562	19,0
	Mujeres	364	4,3
B20-B24	Infección por VIH y SIDA	398	2,4
	Hombres	347	4,2
	Mujeres	51	0,6
A15-A19	Tuberculosis	261	1,6
	Hombres	191	2,3
	Mujeres	70	0,8

Fuente: Comité Nacional de Estadísticas Vitales


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Chile, 1990 y 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Arica y Parinacota: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	186.147
Hombres	90.716
Mujeres	95.431
Índice de masculinidad	95,1
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,7
Porcentaje de población de 65 y más años	9,6
Población beneficiaria del seguro público de salud	132.636
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	3.175
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	16,8
Mortalidad General (Número de Defunciones)	1.034
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,5
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,3
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	4,7
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,0
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	7,9
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	5,4
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,5
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	9,4
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	2,13
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	4,3
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	15,9
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	14.582
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	78,6
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	8,8
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	49,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	1,8
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	35,2
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	13,4
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	45,2
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	391
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	93,5
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,0
Altas odontológicas por mil habitantes	35,1
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	97,5
Pentavalente (3a dosis)	92,4
Trivirica (12 meses)	100,0
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	40,6
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,0
VIH-SIDA (B20-B24)	36,3

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	1.034	548,5
Hombres	583	630,1
Mujeres	451	469,8
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	265	140,6
Hombres	151	163,2
Mujeres	114	118,8
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	217	115,1
Hombres	118	127,5
Mujeres	99	103,1
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	85	45,1
Hombres	55	59,4
Mujeres	30	31,3
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	96	50,9
Hombres	56	60,5
Mujeres	40	41,7
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	96	50,9
Hombres	75	81,1
Mujeres	21	21,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	63	33,4
Hombres	45	48,6
Mujeres	18	18,8
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	82	43,5
Hombres	32	34,6
Mujeres	50	52,1
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	47	24,9
Hombres	24	25,9
Mujeres	23	24,0
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	27	14,3
Hombres	13	14,1
Mujeres	14	14,6
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	62	32,9
Hombres	41	44,3
Mujeres	21	21,9
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	31	16,4
Hombres	23	24,9
Mujeres	8	8,3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	16	8,5
Hombres	14	15,1
Mujeres	2	2,1
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	9	4,8
Hombres	8	8,6
Mujeres	1	1,0
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	8	4,2
Hombres	5	5,4
Mujeres	3	3,1

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región de Arica y Parinacota, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Tarapacá: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	307.426
Hombres	159.586
Mujeres	147.840
Índice de masculinidad	107,9
Porcentaje de población de menores de 15 años	25,0
Porcentaje de población de 65 y más años	6,1
Población beneficiaria del seguro público de salud	212.142
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	5.027
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	17,1
Mortalidad General (Número de Defunciones)	1.156
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	3,9
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	4,2
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	3,6
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	59,7
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	7,6
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	3,6
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	4,0
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	9,2
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	2,68
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	4,3
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	17,0
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	19.932
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	68,8
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	5,6
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	50,5
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	3,3
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	30,8
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	11,9
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	51,0
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	444
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	86,6
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,2
Altas odontológicas por mil habitantes	29,4
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a dosis)	95,3
Trivírica (12 meses)	95,3
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	25,3
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,3
VIH-SIDA (B20-B24)	20,3

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	1.156	394,3
Hombres	645	424,3
Mujeres	511	362,0
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	277	94,5
Hombres	156	102,6
Mujeres	121	85,7
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	261	89,0
Hombres	146	96,0
Mujeres	115	81,5
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	83	28,3
Hombres	43	28,3
Mujeres	40	28,3
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	94	32,1
Hombres	62	40,8
Mujeres	32	22,7
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	130	44,3
Hombres	94	61,8
Mujeres	36	25,5
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	86	29,3
Hombres	56	36,8
Mujeres	30	21,3
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	93	31,7
Hombres	49	32,2
Mujeres	44	31,2
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	41	14,0
Hombres	16	10,5
Mujeres	25	17,7
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	20	6,8
Hombres	4	2,6
Mujeres	16	11,3
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	60	20,5
Hombres	48	31,6
Mujeres	12	8,5
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	43	14,7
Hombres	29	19,1
Mujeres	14	9,9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	24	8,2
Hombres	19	12,5
Mujeres	5	3,5
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	12	4,1
Hombres	10	6,6
Mujeres	2	1,4
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	4	1,4
Hombres	4	2,6
Mujeres	0	0,0

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Región de Tarapacá, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Antofagasta: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	568.432
Hombres	295.921
Mujeres	272.511
Índice de masculinidad	108,6
Porcentaje de población de menores de 15 años	24,7
Porcentaje de población de 65 y más años	6,2
Población beneficiaria del seguro público de salud	363.182
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	9.474
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	17,1
Mortalidad General (Número de Defunciones)	2.799
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,0
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	5,4
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	4,6
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	21,1
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	10,8
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	7,6
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	3,2
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	12,1
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	2,79
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	6,9
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	17,5
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	48.485
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	88,3
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	11,9
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	47,8
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	4,0
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	21,4
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	11,6
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	46,6
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	1241
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	124,2
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	1,6
Altas odontológicas por mil habitantes	22,8
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	96,7
Pentavalente (3a dosis)	92,9
Trivírica (12 meses)	91,2
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	12,6
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,7
VIH-SIDA (B20-B24)	12,6

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	2.799	504,5
Hombres	1.570	543,6
Mujeres	1.229	462,1
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	759	136,8
Hombres	430	148,9
Mujeres	329	123,7
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	693	124,9
Hombres	345	119,5
Mujeres	348	130,9
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	215	38,8
Hombres	115	39,8
Mujeres	100	37,6
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	196	35,3
Hombres	134	46,4
Mujeres	62	23,3
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	243	43,8
Hombres	191	66,1
Mujeres	52	19,6
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	255	46,0
Hombres	153	53,0
Mujeres	102	38,4
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	199	35,9
Hombres	87	30,1
Mujeres	112	42,1
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	95	17,1
Hombres	48	16,6
Mujeres	47	17,7
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	92	16,6
Hombres	46	15,9
Mujeres	46	17,3
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	124	22,4
Hombres	96	33,2
Mujeres	28	10,5
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	64	11,5
Hombres	53	18,4
Mujeres	11	4,1
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	67	12,1
Hombres	52	18,0
Mujeres	15	5,6
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	15	2,7
Hombres	14	4,8
Mujeres	1	0,4
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	17	3,1
Hombres	12	4,2
Mujeres	5	1,9

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región de Antofagasta, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Atacama: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	278.515
Hombres	142.138
Mujeres	136.377
Índice de masculinidad	104,2
Porcentaje de población de menores de 15 años	25,0
Porcentaje de población de 65 y más años	7,7
Población beneficiaria del seguro público de salud	217.857
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	4.736
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	17,3
Mortalidad General (Número de Defunciones)	1.352
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	4,9
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	5,7
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	4,2
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	42,2
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	9,9
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	7,6
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,3
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	11,2
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	3,55
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,9
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	19,4
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	20.209
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	74,6
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	10,3
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	49,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	30,3
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	8,3
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	49,6
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	623
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	102,9
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,3
Altas odontológicas por mil habitantes	28,6
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	97,0
Pentavalente (3a dosis)	97,3
Trivírica (12 meses)	95,7
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	16,3
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,0
VIH-SIDA (B20-B24)	6,5

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	1.352	492,6
Hombres	794	567,1
Mujeres	558	415,1
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	316	115,1
Hombres	193	137,9
Mujeres	123	91,5
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	347	126,4
Hombres	184	131,4
Mujeres	163	121,2
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	166	60,5
Hombres	111	79,3
Mujeres	55	40,9
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	77	28,1
Hombres	48	34,3
Mujeres	29	21,6
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	113	41,2
Hombres	93	66,4
Mujeres	20	14,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	76	27,7
Hombres	50	35,7
Mujeres	26	19,3
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	126	45,9
Hombres	65	46,4
Mujeres	61	45,4
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	47	17,1
Hombres	21	15,0
Mujeres	26	19,3
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	48	17,5
Hombres	25	17,9
Mujeres	23	17,1
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	47	17,1
Hombres	28	20,0
Mujeres	19	14,1
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	32	11,7
Hombres	25	17,9
Mujeres	7	5,2
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	28	10,2
Hombres	24	17,1
Mujeres	4	3,0
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	4	1,5
Hombres	4	2,9
Mujeres	0	0,0
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	2	0,7
Hombres	1	0,7
Mujeres	1	0,7

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Región de Atacama, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Coquimbo: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	708.369
Hombres	350.703
Mujeres	357.666
Índice de masculinidad	98,1
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,7
Porcentaje de población de 65 y más años	9,3
Población beneficiaria del seguro público de salud	608.624
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	9.877
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	14,4
Mortalidad General (Número de Defunciones)	3.541
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,1
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	5,7
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	4,6
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	40,5
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	9,8
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	7,6
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,2
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	11,4
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	4,32
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,9
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	20,0
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	49.003
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	72,5
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	8,6
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	48,8
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	3,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	30,8
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	10,9
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	49,0
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	911
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	78,2
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,1
Altas odontológicas por mil habitantes	30,4
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	96,6
Pentavalente (3a dosis)	93,5
Trivírica (12 meses)	87,3
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	11,0
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,7
VIH-SIDA (B20-B24)	10,3

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	3.541	514,9
Hombres	1.933	567,9
Mujeres	1.608	463,0
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	918	133,5
Hombres	476	139,8
Mujeres	442	127,3
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	969	140,9
Hombres	486	142,8
Mujeres	483	139,1
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	339	49,3
Hombres	189	55,5
Mujeres	150	43,2
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	224	32,6
Hombres	138	40,5
Mujeres	86	24,8
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	256	37,2
Hombres	200	58,8
Mujeres	56	16,1
Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	343	49,9
Hombres	189	55,5
Mujeres	154	44,3
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	271	39,4
Hombres	131	38,5
Mujeres	140	40,3
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	114	16,6
Hombres	59	17,3
Mujeres	55	15,8
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	152	22,1
Hombres	68	20,0
Mujeres	84	24,2
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	135	19,6
Hombres	96	28,2
Mujeres	39	11,2
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	78	11,3
Hombres	59	17,3
Mujeres	19	5,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	77	11,2
Hombres	64	18,8
Mujeres	13	3,7
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	16	2,3
Hombres	15	4,4
Mujeres	1	0,3
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	14	2,0
Hombres	13	3,8
Mujeres	1	0,3

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Región de Coquimbo, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Valparaíso: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	1.739.876
Hombres	856.761
Mujeres	883.115
Índice de masculinidad	97,0
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,6
Porcentaje de población de 65 y más años	10,4
Población beneficiaria del seguro público de salud	1.297.826
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	22.812
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	13,4
Mortalidad General (Número de Defunciones)	10.912
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	6,4
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	6,1
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	17,5
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	8,8
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	6,3
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,5
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,1
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	2,41
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	6,2
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	16,6
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	125.992
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	75,6
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	8,2
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	48,1
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,9
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	31,0
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	9,1
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	53,7
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	4851
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	103,8
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,6
Altas odontológicas por mil habitantes	60,2
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	95,6
Pentavalente (3a dosis)	96,8
Trivírica (12 meses)	90,6
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	12,1
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,3
VIH-SIDA (B20-B24)	11,4

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	10.912	641,4
Hombres	5.608	669,6
Mujeres	5.304	614,0
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	2.629	154,5
Hombres	1.332	159,1
Mujeres	1.297	150,1
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	3.439	202,1
Hombres	1.693	202,2
Mujeres	1.746	202,1
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	1.019	59,9
Hombres	522	62,3
Mujeres	497	57,5
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	667	39,2
Hombres	394	47,0
Mujeres	273	31,6
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	672	39,5
Hombres	515	61,5
Mujeres	157	18,2
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	1140	67,0
Hombres	653	78,0
Mujeres	487	56,4
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	1083	63,7
Hombres	489	58,4
Mujeres	594	68,8
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	380	22,3
Hombres	199	23,8
Mujeres	181	21,0
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	406	23,9
Hombres	183	21,9
Mujeres	223	25,8
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	373	21,9
Hombres	252	30,1
Mujeres	121	14,0
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	187	11,0
Hombres	153	18,3
Mujeres	34	3,9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	174	10,2
Hombres	146	17,4
Mujeres	28	3,2
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	56	3,3
Hombres	45	5,4
Mujeres	11	1,3
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	25	1,5
Hombres	19	2,3
Mujeres	6	0,7


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte. Región de Valparaíso, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región Metropolitana de Santiago: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	6.814.630
Hombres	3.324.216
Mujeres	3.490.414
Índice de masculinidad	95,2
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,4
Porcentaje de población de 65 y más años	8,6
Población beneficiaria del seguro público de salud	4.757.998
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	98.160
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	14,7
Mortalidad General (Número de Defunciones)	35.317
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,3
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	5,5
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,1
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	15,3
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	7,4
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	4,8
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,6
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	8,3
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	2,08
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	6,0
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	14,9
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	458.676
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	69,9
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	7,8
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	51,7
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	3,0
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	29,7
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	10,6
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	50,1
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	15275
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	89,3
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,3
Altas odontológicas por mil habitantes	48,3
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	100,0
Pentavalente (3a dosis)	94,9
Trivírica (12 meses)	90,8
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	15,4
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,8
VIH-SIDA (B20-B24)	9,1

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	35.317	529,0
Hombres	17.995	552,6
Mujeres	17.322	506,4
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	8.056	120,7
Hombres	4.052	124,4
Mujeres	4.004	117,1
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	10.040	150,4
Hombres	4.809	147,7
Mujeres	5.231	152,9
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	3.655	54,7
Hombres	1.733	53,2
Mujeres	1.922	56,2
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	2.508	37,6
Hombres	1.465	45,0
Mujeres	1.043	30,5
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	2.754	41,2
Hombres	2.116	65,0
Mujeres	638	18,7
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	3252	48,7
Hombres	1848	56,8
Mujeres	1404	41,0
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	3027	45,3
Hombres	1354	41,6
Mujeres	1673	48,9
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	1583	23,7
Hombres	791	24,3
Mujeres	792	23,2
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	1381	20,7
Hombres	596	18,3
Mujeres	785	23,0
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	1499	22,5
Hombres	994	30,5
Mujeres	505	14,8
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	690	10,3
Hombres	556	17,1
Mujeres	134	3,9
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	638	9,6
Hombres	510	15,7
Mujeres	128	3,7
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	198	3,0
Hombres	174	5,3
Mujeres	24	0,7
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	78	1,2
Hombres	54	1,7
Mujeres	24	0,7

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región Metropolitana de Santiago, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región del Libertador Bernardo O'Higgins: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	874.806
Hombres	441.192
Mujeres	433.614
Índice de masculinidad	101,7
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,1
Porcentaje de población de 65 y más años	8,9
Población beneficiaria del seguro público de salud	683.468
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	12.251
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	14,3
Mortalidad General (Número de Defunciones)	4.822
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,6
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,2
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,0
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	24,5
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	8,0
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	5,3
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,7
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	9,1
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	3,82
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,8
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	17,5
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	66.984
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	79,4
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	6,6
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	55,6
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,9
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	30,1
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	10,3
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	52,0
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	1485
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	85,4
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,2
Altas odontológicas por mil habitantes	26,4
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	97,0
Pentavalente (3a dosis)	95,4
Trivírica (12 meses)	94,6
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	9,8
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,6
VIH-SIDA (B20-B24)	7,3

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	4.822	562,2
Hombres	2.695	623,0
Mujeres	2.127	500,3
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	989	115,3
Hombres	527	121,8
Mujeres	462	108,7
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	1.257	146,6
Hombres	659	152,4
Mujeres	598	140,7
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	618	72,1
Hombres	326	75,4
Mujeres	292	68,7
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	358	41,7
Hombres	220	50,9
Mujeres	138	32,5
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	496	57,8
Hombres	387	89,5
Mujeres	109	25,6
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	428	49,9
Hombres	243	56,2
Mujeres	185	43,5
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	395	46,1
Hombres	206	47,6
Mujeres	189	44,5
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	193	22,5
Hombres	101	23,3
Mujeres	92	21,6
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	301	35,1
Hombres	150	34,7
Mujeres	151	35,5
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	223	26,0
Hombres	161	37,2
Mujeres	62	14,6
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	184	21,5
Hombres	147	34,0
Mujeres	37	8,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	113	13,2
Hombres	91	21,0
Mujeres	22	5,2
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	22	2,6
Hombres	18	4,2
Mujeres	4	0,9
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	6	0,7
Hombres	6	1,4
Mujeres	0	0,0


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región Del Libertador Bernardo O'Higgins, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región Del Maule: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	999.685
Hombres	498.212
Mujeres	501.473
Índice de masculinidad	99,3
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,9
Porcentaje de población de 65 y más años	9,0
Población beneficiaria del seguro público de salud	795.353
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	13.654
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	13,9
Mortalidad General (Número de Defunciones)	5.898
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	6,0
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,7
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,3
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	14,6
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	8,4
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	5,5
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,9
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,5
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	2,14
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,5
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	17,2
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	81.753
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	84,5
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	7,3
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	55,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,3
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	31,5
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	10,3
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	49,6
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	2474
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	87,2
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,3
Altas odontológicas por mil habitantes	46,4
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	93,5
Pentavalente (3a dosis)	95,3
Trivírica (12 meses)	94,8
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	9,5
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,6
VIH-SIDA (B20-B24)	5,3

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	5.898	599,8
Hombres	3.308	674,3
Mujeres	2.590	525,5
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	1.351	137,4
Hombres	722	147,2
Mujeres	629	127,6
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	1.748	177,8
Hombres	933	190,2
Mujeres	815	165,4
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	615	62,5
Hombres	297	60,5
Mujeres	318	64,5
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	392	39,9
Hombres	261	53,2
Mujeres	131	26,6
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	606	61,6
Hombres	492	100,3
Mujeres	114	23,1
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	581	59,1
Hombres	354	72,2
Mujeres	227	46,1
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	584	59,4
Hombres	298	60,7
Mujeres	286	58,0
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	225	22,9
Hombres	101	20,6
Mujeres	124	25,2
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	305	31,0
Hombres	146	29,8
Mujeres	159	32,3
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	254	25,8
Hombres	188	38,3
Mujeres	66	13,4
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	193	19,6
Hombres	171	34,9
Mujeres	22	4,5
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	130	13,2
Hombres	105	21,4
Mujeres	25	5,1
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	17	1,7
Hombres	16	3,3
Mujeres	1	0,2
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	4	0,4
Hombres	3	0,6
Mujeres	1	0,2

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región Del Maule, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región Del BíoBío: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	2.022.995
Hombres	997.291
Mujeres	1.025.704
Índice de masculinidad	97,2
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,7
Porcentaje de población de 65 y más años	9,0
Población beneficiaria del seguro público de salud	1.577.895
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	27.897
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	14,0
Mortalidad General (Número de Defunciones)	11.816
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,9
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,2
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	14,3
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	8,5
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	5,8
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,7
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,1
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	1,90
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,3
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	16,3
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	164.932
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	83,9
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	7,2
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	52,7
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,6
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	32,6
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	9,5
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	52,9
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	5237
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	116,1
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,9
Altas odontológicas por mil habitantes	52,2
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	91,1
Pentavalente (3a dosis)	93,3
Trivírica (12 meses)	94,2
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	18,4
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,5
VIH-SIDA (B20-B24)	7,9

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	11.816	592,0
Hombres	6.526	662,9
Mujeres	5.290	522,9
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	2.688	134,7
Hombres	1.392	141,4
Mujeres	1.296	128,1
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	3.406	170,6
Hombres	1.814	184,3
Mujeres	1.592	157,4
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	1.180	59,1
Hombres	567	57,6
Mujeres	613	60,6
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	977	48,9
Hombres	612	62,2
Mujeres	365	36,1
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	1.112	55,7
Hombres	878	89,2
Mujeres	234	23,1
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	1052	52,7
Hombres	633	64,3
Mujeres	419	41,4
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	1185	59,4
Hombres	611	62,1
Mujeres	574	56,7
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	424	21,2
Hombres	200	20,3
Mujeres	224	22,1
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	462	23,1
Hombres	201	20,4
Mujeres	261	25,8
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	631	31,6
Hombres	446	45,3
Mujeres	185	18,3
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	289	14,5
Hombres	234	23,8
Mujeres	55	5,4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	292	14,6
Hombres	233	23,7
Mujeres	59	5,8
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	21	1,1
Hombres	19	1,9
Mujeres	2	0,2
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	49	2,5
Hombres	38	3,9
Mujeres	11	1,1


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región Del Biobío, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de La Araucanía: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	962.120
Hombres	476.948
Mujeres	485.172
Índice de masculinidad	98,3
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,9
Porcentaje de población de 65 y más años	9,5
Población beneficiaria del seguro público de salud	732.349
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	13.520
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	14,3
Mortalidad General (Número de Defunciones)	5.806
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	6,1
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,8
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,5
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	14,8
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	9,2
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	6,1
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	3,1
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,8
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	7,73
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	4,8
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	18,1
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	78.141
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	84,2
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	5,9
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	55,3
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,4
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	36,2
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	8,6
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	52,8
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	2247
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	117,1
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,4
Altas odontológicas por mil habitantes	41,6
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	97,2
Pentavalente (3a dosis)	96,2
Trivírica (12 meses)	88,9
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	12,5
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,4
VIH-SIDA (B20-B24)	6,5

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	5.806	614,0
Hombres	3.177	677,4
Mujeres	2.629	551,7
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	1.318	139,4
Hombres	653	139,2
Mujeres	665	139,5
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	1.392	147,2
Hombres	764	162,9
Mujeres	628	131,8
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	606	64,1
Hombres	285	60,8
Mujeres	321	67,4
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	340	36,0
Hombres	213	45,4
Mujeres	127	26,7
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	608	64,3
Hombres	488	104,1
Mujeres	120	25,2
Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	410	43,4
Hombres	246	52,5
Mujeres	164	34,4
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	523	55,3
Hombres	256	54,6
Mujeres	267	56,0
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	185	19,6
Hombres	89	19,0
Mujeres	96	20,1
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	274	29,0
Hombres	125	26,7
Mujeres	149	31,3
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	202	21,4
Hombres	151	32,2
Mujeres	51	10,7
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	151	16,0
Hombres	124	26,4
Mujeres	27	5,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	146	15,4
Hombres	117	24,9
Mujeres	29	6,1
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	8	0,8
Hombres	7	1,5
Mujeres	1	0,2
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	15	1,6
Hombres	9	1,9
Mujeres	6	1,3

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región De La Araucanía, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Los Ríos: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	378.193
Hombres	188.846
Mujeres	189.347
Índice de masculinidad	99,7
Porcentaje de población de menores de 15 años	22,9
Porcentaje de población de 65 y más años	9,7
Población beneficiaria del seguro público de salud	306.057
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	5.203
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	13,9
Mortalidad General (Número de Defunciones)	2.408
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	6,4
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	7,4
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,5
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	38,4
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	9,6
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	6,2
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	3,5
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	11,1
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	5,81
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,3
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	20,4
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	32.688
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	88,8
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	7,0
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	51,3
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,5
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	36,5
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	5,3
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	63,1
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	1182
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	129,7
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,8
Altas odontológicas por mil habitantes	56,9
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	95,2
Pentavalente (3a dosis)	91,2
Trivírica (12 meses)	93,3
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	10,6
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,8
VIH-SIDA (B20-B24)	8,0

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	2.408	641,8
Hombres	1.381	736,2
Mujeres	1.027	547,4
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	538	143,4
Hombres	289	154,1
Mujeres	249	132,7
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	690	183,9
Hombres	391	208,4
Mujeres	299	159,4
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	241	64,2
Hombres	126	67,2
Mujeres	115	61,3
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	146	38,9
Hombres	94	50,1
Mujeres	52	27,7
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	243	64,8
Hombres	202	107,7
Mujeres	41	21,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	202	53,8
Hombres	135	72,0
Mujeres	67	35,7
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	253	67,4
Hombres	135	72,0
Mujeres	118	62,9
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	75	20,0
Hombres	32	17,1
Mujeres	43	22,9
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	108	28,8
Hombres	55	29,3
Mujeres	53	28,3
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	95	25,3
Hombres	69	36,8
Mujeres	26	13,9
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	54	14,4
Hombres	47	25,1
Mujeres	7	3,7
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	62	16,5
Hombres	52	27,7
Mujeres	10	5,3
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	2	0,5
Hombres	2	1,1
Mujeres	0	0,0
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	9	2,4
Hombres	7	3,7
Mujeres	2	1,1


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



**Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región De Los Ríos, 2007.**



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Los Lagos: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	825.830
Hombres	419.312
Mujeres	406.518
Índice de masculinidad	103,1
Porcentaje de población de menores de 15 años	23,9
Porcentaje de población de 65 y más años	8,4
Población beneficiaria del seguro público de salud	632.435
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	12.397
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	15,4
Mortalidad General (Número de Defunciones)	4.731
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	5,9
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,1
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,0
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	9,2
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	6,3
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,9
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,2
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	5,05
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,4
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	18,4
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	72.212
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	91,1
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	4,5
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	54,1
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,5
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	38,3
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	7,2
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	57,3
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	1682
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	99,3
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	2,4
Altas odontológicas por mil habitantes	53,1
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	96,8
Pentavalente (3a dosis)	97,2
Trivírica (12 meses)	93,5
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	15,1
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,5
VIH-SIDA (B20-B24)	11,4

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	4.731	587,7
Hombres	2.702	661,6
Mujeres	2.029	511,6
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	1.016	126,2
Hombres	511	125,1
Mujeres	505	127,3
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	1.166	144,8
Hombres	641	157,0
Mujeres	525	132,4
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	504	62,6
Hombres	282	69,1
Mujeres	222	56,0
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	364	45,2
Hombres	231	56,6
Mujeres	133	33,5
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	512	63,6
Hombres	431	105,5
Mujeres	81	20,4
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	379	47,1
Hombres	231	56,6
Mujeres	148	37,3
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	343	42,6
Hombres	181	44,3
Mujeres	162	40,8
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	176	21,9
Hombres	85	20,8
Mujeres	91	22,9
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	186	23,1
Hombres	84	20,6
Mujeres	102	25,7
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	211	26,2
Hombres	160	39,2
Mujeres	51	12,9
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	103	12,8
Hombres	86	21,1
Mujeres	17	4,3
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	124	15,4
Hombres	106	26,0
Mujeres	18	4,5
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	18	2,2
Hombres	15	3,7
Mujeres	3	0,8
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	24	3,0
Hombres	15	3,7
Mujeres	9	2,3


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región De Los Lagos, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	103.738
Hombres	54.598
Mujeres	49.140
Índice de masculinidad	111,1
Porcentaje de población de menores de 15 años	25,3
Porcentaje de población de 65 y más años	6,7
Población beneficiaria del seguro público de salud	73.122
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	1.679
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	16,5
Mortalidad General (Número de Defunciones)	445
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	4,4
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	5,5
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	3,2
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	59,6
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	8,3
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	7,7
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	0,6
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,7
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	4,27
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,8
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	20,5
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	8.063
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	80,4
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNSS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	4,6
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	57,1
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	2,6
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	41,0
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	6,2
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	58,7
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	239
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	124,1
Atención ambulatoria otorgada por el SNSS	
Atenciones médicas por habitante	3,0
Altas odontológicas por mil habitantes	45,0
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	93,5
Pentavalente (3a dosis)	92,2
Trivírica (12 meses)	94,2
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	16,6
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	1,0
VIH-SIDA (B20-B24)	4,9

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	445	438,3
Hombres	292	546,2
Mujeres	153	318,3
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	120	118,2
Hombres	72	134,7
Mujeres	48	99,9
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	111	109,3
Hombres	73	136,6
Mujeres	38	79,1
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	41	40,4
Hombres	27	50,5
Mujeres	14	29,1
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	31	30,5
Hombres	22	41,2
Mujeres	9	18,7
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	60	59,1
Hombres	49	91,7
Mujeres	11	22,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo		
	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	44	43,3
Hombres	35	65,5
Mujeres	9	18,7
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	37	36,4
Hombres	22	41,2
Mujeres	15	31,2
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	4	3,9
Hombres	2	3,7
Mujeres	2	4,2
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	13	12,8
Hombres	7	13,1
Mujeres	6	12,5
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	19	18,7
Hombres	14	26,2
Mujeres	5	10,4
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	12	11,8
Hombres	12	22,4
Mujeres	0	0,0
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	17	16,7
Hombres	14	26,2
Mujeres	3	6,2
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	0	0,0
Hombres	0	0,0
Mujeres	0	0,0
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	0	0,0
Hombres	0	0,0
Mujeres	0	0,0


*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región De Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo, 2007.



[Ir a Pág Principal](#)

[Ir a Gráficos](#)

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena: Indicadores Básicos


Indicadores Demográficos (2009)	
Población (Ambos Sexos)	158.111
Hombres	83.131
Mujeres	74.980
Índice de masculinidad	110,9
Porcentaje de población de menores de 15 años	21,5
Porcentaje de población de 65 y más años	8,5
Población beneficiaria del seguro público de salud	113.282
Indicadores de Estadísticas Vitales (2007)	
Natalidad (Número de Nacidos vivos)	2.194
Natalidad (Tasa por 1.000 habitantes)	14,0
Mortalidad General (Número de Defunciones)	963
Mortalidad General (Tasa por 1.000 habitantes)	6,1
Mortalidad Masculina (Tasa por 1.000 hombres)	6,6
Mortalidad Femenina (Tasa por 1.000 mujeres)	5,6
Mortalidad Materna (Tasa por 100 mil nacidos vivos)	0,0
Mortalidad Infantil (Tasa por mil nacidos vivos)	9,1
Mortalidad Neonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	6,8
Mortalidad Postneonatal (Tasa por mil nacidos vivos)	2,3
Razón de Mortalidad Menores de 5 Años	10,9
Porcentaje de Defunciones por Síntomas y Estados Morbosos Mal Definidos	0,73
Indicadores de riesgo para la salud	
Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer (2007)	5,1
Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años de edad (2007)	15,3
Años de Vida Potenciales Perdidos (2007)	14.723
Años de Vida Potenciales Perdidos por 1.000 habitantes (2007)	95,2
Malnutrición de Población (en %) en Control en Establecimientos del SNS de (2008):	
Embarazadas (Mal nutrición por déficit)	4,4
Embarazadas (Mal nutrición por exceso)	59,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por déficit)	1,2
Niños y niñas menores de 6 años (Mal nutrición por exceso)	39,0
Adultos mayores (Mal nutrición por déficit)	3,5
Adultos mayores (Mal nutrición por exceso)	66,5
Indicadores de acceso a la atención (2008)	
Atención de hospitalización, sectores público y privado	
Camas de hospitalización	560
Egresos Hospitalarios por mil habitantes	148,4
Atención ambulatoria otorgada por el SNS	
Atenciones médicas por habitante	2,6
Altas odontológicas por mil habitantes	35,0
Cobertura de Inmunizaciones	
BCG (Recién nacido)	97,3
Pentavalente (3a dosis)	94,4
Trivírica (12 meses)	93,6
Incidencia Notificada de algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria	
Tuberculosis (A15-A19)	16,5
Enfermedad Meningocócica (A39.-)	0,6
VIH-SIDA (B20-B24)	8,3

Algunos Indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2007.		
Gran grupo de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Todas las causas	963	613,3
Hombres	544	659,0
Mujeres	419	562,5
Tumores malignos (CIE-10: C00-C97)	248	157,9
Hombres	128	155,1
Mujeres	120	161,1
Enfermedades del sistema circulatorio (CIE-10: I00-I99)	302	192,3
Hombres	178	215,6
Mujeres	124	166,5
Enfermedades del sistema respiratorio (CIE-10: J00-J99)	63	40,1
Hombres	31	37,6
Mujeres	32	43,0
Enfermedades del sistema digestivo (CIE-10: K00-K93)	86	54,8
Hombres	52	63,0
Mujeres	34	45,6
Causas externas de mortalidad (CIE-10: V00-Y98)	93	59,2
Hombres	73	88,4
Mujeres	20	26,9
Grupo específico de causas de muerte y sexo	Defunciones	Tasa *
Enfermedad isquémica del corazón (CIE-10: I20-I25)	115	73,2
Hombres	79	95,7
Mujeres	36	48,3
Enfermedades cerebrovasculares (CIE-10: I60-I69)	77	49,0
Hombres	42	50,9
Mujeres	35	47,0
Diabetes mellitus (CIE-10: E10-E14)	36	22,9
Hombres	18	21,8
Mujeres	18	24,2
Neumonía (CIE-10: J12-J18)	28	17,8
Hombres	13	15,7
Mujeres	15	20,1
Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del hígado (CIE-10: K70-K76)	52	33,1
Hombres	36	43,6
Mujeres	16	21,5
Accidentes de tránsito terrestre (CIE-10: V02-V04; V09.-; V12-V14; V19.-; V20-V79; V86-V89)	13	8,3
Hombres	9	10,9
Mujeres	4	5,4
Lesiones autoinfligidas intencionalmente (CIE-10: X60-X84)	18	11,5
Hombres	15	18,2
Mujeres	3	4,0
VIH-SIDA (CIE-10: B20-B24)	0	0,0
Hombres	0	0,0
Mujeres	0	0,0
Tuberculosis (CIE-10: A15-A19)	6	3,8
Hombres	5	6,1
Mujeres	1	1,3

*Tasa por 100.000 habitantes

[Ir a Pág Principal](#)

[Volver a Tabla](#)



Defunciones por grandes grupos de causas de muerte.
Región De Magallanes, y de La Antártica Chilena, 2007.

